

## **Folheto Informativo: Informação para o utilizador**

### **CAVINTON, 5 mg, comprimidos (Vinpocetina)**

#### **Leia atentamente este folheto antes de tomar o medicamento.**

- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o reler.
- Caso ainda tenha dúvidas, fale com o seu médico ou farmacêutico.
- Este medicamento foi receitado para si. Não deve dá-lo a outros; o medicamento pode ser-lhes prejudicial mesmo que apresentem os mesmos sintomas.
- Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detetar quaisquer efeitos secundários não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico.

#### **Neste folheto:**

1. O que é CAVINTON e para que é utilizado
2. Antes de tomar CAVINTON
3. Como tomar CAVINTON
4. Efeitos secundários possíveis
5. Como conservar CAVINTON
6. Outras informações

#### **1. O que é CAVINTON e para que é utilizado?**

Grupo farmacoterapêutico: 2.13.1 Sistema Nervoso Central. Medicamentos utilizados no tratamento sintomático das alterações das funções cognitivas.

Código ATC: N06BX18 – Psicoanalépticos. Outros psicoestimulantes e nootrópicos.  
Vinpocetina

A Vinpocetina é quimicamente um éster etílico do ácido apovincamínico. A sua acção terapêutica exerce-se, de um modo geral, como reguladora da circulação cerebral e periférica, especialmente indicada nas disfunções cérebro-vasculares.

#### **Indicações terapêuticas**

O seu médico receitou-lhe os comprimidos de CAVINTON porque você sofre de uma doença provocada por alterações resultantes da progressiva disfunção cérebro-vascular (na maior parte das vezes atribuível à idade e à aterosclerose). Estas alterações podem ser psíquicas, neurológicas, angiográficas ou eletroencefalográficas. A vinpocetina é um ativador do metabolismo cerebral.

Em Oftalmologia o recurso à utilização do CAVINTON deve-se a alterações vasculares degenerativas do fundo do olho ou a glaucoma secundário.

Em Otorrinolaringologia o recurso à utilização do CAVINTON deve-se a alterações da audição de origem vascular ou à existência de vertigens de origem vestibular.

No caso de ter qualquer dúvida converse e esclareça-a com o seu médico.

## **2. Antes de tomar CAVINTON**

### **Não tome CAVINTON**

- Se tomou medicamentos contendo vinpocetina anteriormente e surgiram sinais e sintomas de reação alérgica (ex. comichão, vermelhidão, etc).
- Se é reconhecidamente alérgico a qualquer dos outros produtos que fazem parte da constituição de CAVINTON (ver 1. O que é CAVINTON e para que é utilizado)
- Se está grávida. CAVINTON não deve ser tomado por grávidas.
- Se está a amamentar um bebé. CAVINTON não deve ser tomado por mulheres em período de amamentação.

### **Tome especial cuidado com CAVINTON**

Quando tenha lesões inflamatórias oculares deve utilizar CAVINTON com precaução e sob controlo médico.

### **Tomar CAVINTON com outros medicamentos**

Embora até à data não se tenham registado interações entre CAVINTON e outros medicamentos, deve indicar todos os medicamentos que está a tomar habitualmente, mesmo que não tenham sido prescritos pelo seu médico assistente.

Antes de um médico, ou farmacêutico, lhe dar qualquer outro medicamento, certifique-se que eles estão informados de que está a tomar CAVINTON, há quanto tempo e para tratar que doença.

### **Condução de veículos e utilização de máquinas**

O tratamento com CAVINTON não é susceptível de produzir alterações neurosensoriais de modo a interferir com a capacidade de conduzir veículos, bem como utilizar máquinas. Contudo deverá discutir este assunto com o seu médico assistente, caso o entenda.

## **3. Como tomar CAVINTON**

Acima de tudo siga as instruções do seu médico assistente enquanto estiver a tomar o seu medicamento. Será o seu médico quem decidirá quantas vezes por dia deve tomar CAVINTON. A dose habitual, excetuando indicações médicas em contrário, varia entre valores de 15 a 30 mg por dia e repartidos em três tomas diárias de 1 a 2 comprimidos de 5 mg. Deverá prosseguir o tratamento regularmente durante o tempo que o seu médico indicar. Contudo o seu médico assistente pode indicar-lhe outro modo de tomar CAVINTON.

**DEVE COMPLETAR O TRATAMENTO** tomando o número de comprimidos por dia, durante o tempo que o seu médico lhe indicou.

Os comprimidos de CAVINTON devem ser engolidos, com o auxílio de um líquido e de preferência no momento das três principais refeições. Para se lembrar mais facilmente, tome CAVINTON sempre às mesmas refeições, todos os dias.

Se tomar mais CAVINTON do que deveria

No caso de tomar uma dose excessiva (muitos comprimidos), deve contactar de imediato o seu médico assistente, para que ele o(a) observe e lhe dê o tratamento necessário. Na impossibilidade de contacto deve dirigir-se a um centro de urgências e deverá falar com o médico presente sobre o assunto para que este, caso necessário, lhe institua um tratamento sintomático.

Se tomar uma grande quantidade de comprimidos poderão surgir alguns sintomas como sinais de intolerância ao CAVINTON.

Caso se tenha esquecido de tomar CAVINTON

Deverá tentar tomar CAVINTON conforme o indicado pelo seu médico. Os medicamentos resultam mais eficazes no tratamento das doenças se estiverem presentes em quantidades, mais ou menos constantes, no organismo. Para possibilitar estas doses constantes tente não se esquecer de tomar a sua dose diária.

Se falhar uma dose tome-a na vez da dose imediatamente a seguir, regularizando assim as tomas do seu medicamento. Não deve tomar duas doses ao mesmo tempo.

**NÃO UTILIZE UMA QUANTIDADE DE COMPRIMIDOS (DOSE) SUPERIOR À RECOMENDADA PELO SEU MÉDICO ASSISTENTE.** Não será por isso que obterá mais e melhor efeito curativo do medicamento.

#### **4. Efeitos secundários possíveis**

Como os demais medicamentos, CAVINTON pode causar efeitos secundários, no entanto estes não se manifestam em todas as pessoas.

A maioria dos doentes que tomam CAVINTON não sente quaisquer efeitos colaterais, pois a vinpocetina é geralmente bem tolerada.

Muitos raros (< 1/ 10.000), desconhecido (não pode ser calculado a partir dos dados disponíveis)

Cardiopatias: hipotensão transitória, alteração do ritmo cardíaco (taquicardias), extrasístoles

Doenças do sistema imunitário: reações de hipersensibilidade

Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detetar quaisquer efeitos secundários não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico.

#### **5. Como conservar CAVINTON**

CAVINTON deve ser guardado a uma temperatura inferior a 25°C e mantendo a embalagem fechada e protegida da luz

Manter fora do alcance e da vista das crianças.

Não utilize CAVINTON após o prazo de validade impresso na embalagem exterior, a seguir a “VAL.”. O prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado.

Não utilize CAVINTON se verificar sinais visíveis de deterioração.

Os medicamentos não devem ser eliminados na canalização ou no lixo doméstico. Pergunte ao seu farmacêutico como eliminar os medicamentos de que já não necessita. Estas medidas irão ajudar a proteger o ambiente.

## **6. Outras informações**

### **Qual a composição de CAVINTON**

- A substância ativa é a vinpocetina;
  - Os outros componentes são: Lactose monohidratada, Amido de milho, Estearato de Magnésio, Talco e Sílica anidra coloidal.
- CAVINTON não contém conservantes.

Qual o aspeto de CAVINTON e conteúdo da embalagem  
CAVINTON encontra-se acondicionado em embalagens de “blisteres” de PVC / alumínio.

Cada embalagem contém respetivamente 20, 50 e 60 comprimidos, de cor branca, forma circular, com as faces lisas, e uma inscrição “CAVINTON” numa delas.

É possível que não estejam comercializadas todas as apresentações.

### **Titular da Autorização de Introdução no Mercado**

Alfasigma Portugal, Lda  
Avenida. José Malhoa, nº 2 Edifício Malhoa Plaza  
 piso – escritório 2.2  
1070 – 325 Lisboa  
Tel.: 00351 21 722 61 10  
Fax: 00351 21 722 61 19

Fabricante  
Gedeon Richter  
Budapest X,Gyomroi ÚT 19-21.  
BUDAPEST, 10 P.O.B. 27.h-1475  
Hungria

Este folheto foi aprovado pela última vez em maio de 2018.